Tabla 1: Total de Trasplantes y Distribución por sexo:

Total de Trasplantes Cardíacos de 2015 a Marzo 2025	Total N=33	Sin Disfunción primaria del injerto severa	Con disfunción primaria del injerto severa
Sexo		82%	18%
Masculino	21	18	3
Femenino	12	9	3

Tabla 2: Características clínicas y hemodinámicas de pacientes con disfunción primaria del injerto que usaron ECMO V-A.

Variable	Valor
Edad	Mediana (Q1–Q3): 52 (32.5–52.5)
Sexo, n (%)	Masculino: 3 (50%) Femenino: 3 (50%)
Mortalidad intrahospitalaria, n (%)	Sí: 2 (33.3%) No: 4 (66.7%)
Supervivencia al año, n (%)	Sí: 4 (66.7%) No: 2 (33.3%)
Duración de la estancia hospitalaria	Mediana (Q1 – Q3): 29 días (9.25 – 72.5)
Dispositivo de soporte circulatorio mecánico utilizado, n (%)	ECMO: 6 (100%) Dispositivo de asistencia ventricular (DAV): 0 Bomba de flujo microaxial: 0
Descarga del ventrículo izquierdo, n (%)	Sí: 4 (66.7%) No: 2 (33.3%)
Tipo de descarga del ventrículo izquierdo	BIAC: 3 (50%) Drenaje directo de cavidades izquierdas: 2 (33.3%) LAVA-ECMO: 0

CON EL RESPALDO

Variable	Valor
Duración del soporte mecánico (horas)	Mediana (Q1–Q3): 84 (31–96)
Perfil INTERMACS previo a trasplantes, n (%)	1: 1 (16.7%) 2: 0 3: 2 (33.3%) 4: 3 (50%)
TFG preoperatoria (mL/min/1.73 m²)	Media (IC 95%): 79.2 (44.1–114.2)
Tiempo de isquemia del donante (minutos)	Media (IC 95%): 185.7 (148.1–223.2)
Soporte mecánico preoperatorio, n (%)	Sí: 1 (16.7%) No: 5 (83.3%)
Uso preoperatorio de amiodarona, n (%)	Sí: 5 (83.3%) No: 1 (16.7%)
PSAP pretrasplante (mmHg)	Mediana (Q1–Q3): 44.5 (34.5–55.25)
Complicaciones renales, n (%)	Sí: 5 (83.3%) No: 1 (16.7%)
Complicaciones neurológicas, n (%)	Sí: 1 (16.7%) No: 5 (83.3%)
Complicaciones vasculares, n (%)	Sí: 0 No: 6 (100%)
Sangrado masivo durante ECMO, n (%)	Sí: 1 (16.7%) No: 5 (83.3%)
Tipo de DPI, n (%)	Derecha: 1 (16.7%) Izquierda: 2 (33.3%) Biventricular: 3 (50%)
Riesgo inmunológico, n (%)	Bajo: 6 (100%)

Variable	Valor
	Alto: 0
Transfusiones múltiples intraoperatorias, n (%)	Sí: 5 (83.3%) No: 1 (16.7%)
LVIS intraoperatorio antes del soporte mecánico	Media (IC 95%): 50.5 (34.5–66.5)
Tipo de canulación para ECMO, n (%)	Periférica: 5 (83.3%) Central: 1 (16.7%)
Inicio del soporte mecánico en quirófano, n (%)	Sí: 2 (33.3%) No: 4 (66.7%)
FEVI al alta	Mayor del 50% 6(100%) Menor del 50% 0