Tabla 1. Características clínicas basales de los pacientes sometidos a ECMO veno-venoso perioperatorio (n = 7).

Variable	**Resultado**
Edad, años	32 (28–60)
Sexo femenino	4 (57%)
Sexo masculino	3 (43%)
Índice de masa corporal, kg/m²	24.8 (17.1–31.6)
SOFA	8 (0–14)
SAPS II	41 (0–57)
APACHE II	17 (2–27)
RESP Score	−3 (−6 a 4)

Tabla 2. Características del soporte extracorpóreo y del programa multidisciplinario de ECMO (n = 7).

Variable	Resultado
Objetivo clínico del ECMO	
• Facilitar cirugía en apnea prolongada	**3 (43%)**
• Soporte ventilatorio perioperatorio	**3 (43%)**
• Rescate por insuficiencia respiratoria posoperatoria	**1 (14%)**
Momento de inicio del ECMO	
• Preoperatorio	**4 (57%)**
• Intraoperatorio	**2 (29%)**
• Posoperatorio	**1 (14%)**
Duración del ECMO, días	**7 (1–61)**

Tabla 3. Complicaciones y desenlaces de los pacientes tratados mediante ECMO veno-venoso perioperatorio (n = 7).

Variable	Resultado
Hemorragia mayor	4 (57%)
Lesión renal aguda	2 (29%)
Decanulación exitosa	5 (71%)
Supervivencia al retiro del ECMO	5 (71%)
Supervivencia al egreso de la UCI	4 (57%)
Ventilación mecánica, días	15 (1–74)
Estancia en UCI, días	23 (8–61)
Estancia hospitalaria, días	36 (15–61)